



B型肝炎ワクチンを受けた方へ (ヘプタバックス-II)

- ☺ 接種後24時間は、接種部位を清潔に保ち、**疲れすぎることや激しい運動は避けましょう。**
いつもの生活・入浴は構いません。
- ☺ 接種後30分以内に息苦しさや全身のかゆみなどが現れた場合は **速やかに医師の診察を受けてください。**
- ☺ しばらくして、**ものがダブって見える、体がだるい、手足がピリピリする、高熱あるいは2日以上続く熱などがあれば、診察を受けてください。**

体内からB型肝炎ウイルスを排除するのを助ける働きをする抗体を事前に作り、B型肝炎を予防するワクチンです。

※ このワクチン(ヘプタバックス-II)には、チメロサルは含まれていません。バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれていますので、ラテックス過敏症のある方にはアレルギー反応を起こすことがあります。

※ 1週間後には他の予防注射を受けることができます。

- ☺ B型肝炎の予防：4週間隔で2回、1回目の20～24週間後に1回 の計3回接種。
参考(米国での接種方法)：4～8週間隔で2回、生後6ヶ月～1才6ヶ月に1回(あるいは2回目の8週間後かつ1回目から16週間後以降に1回)の計3回接種
- B型肝炎ウイルスの母子感染予防：生後2～3ヶ月、その1ヶ月後と3ヶ月後の計3回。
HBs抗体が獲得されていない場合には追加注射が必要なことがあります。