



ヒブ ワクチン アクトヒブ®

を受けた方へ

- ☺ 今日は接種部位を清潔に保ち、疲れすぎることや激しい運動は避けましょう。いつも通りの生活・入浴は構いません。
- ☺ 接種後30分以内に息苦しさや全身のかゆみなどが現れたときは、大至急診察を受けてください。
- ☺ 接種後に、高熱やけいれんなどの異常が出現した場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。接種後1週間は体調に注意し、接種後、腫れが目立つときや機嫌が悪くなったときなどは医師にご相談下さい。
- ☺ 1週間後には他の予防注射を受けることができます。

今回は 1回目・2回目・3回目・最終

次のヒブワクチンは

- ・ **4～8 週後** (今回が1・2回目の人)
- ・ **1才～1才3ヶ月** (今回が3回目の人)
添付文書では「**7～13ヶ月後**」

※ 本剤は、BSE(牛海綿状脳症いわゆる狂牛病)発生国原産のウシに由来する成分を製造の初期段階に使用しています。14年間に1億5千万回接種されていますが、このワクチンによりTSE(伝達性海綿状脳症)にかかったという報告はありません。従って、理論上のリスクは否定できないもの、TSEにかかる危険性はほとんどないものと考えられます。

※ ヒブワクチンの接種により健康被害が発生した場合には、「医薬品副作用被害救済制度」により治療費等が受けられる場合があります。