



## 麻しん風しん混合ワクチン

MRワクチン

麻疹=ましん=はしか **を受けた方へ**  
風疹=ふうしん=三日はしか

- ◎ 接種後24時間は接種部位を清潔に保ち、**疲れすぎることや激しい運動は避けましょう。**  
いつも通りの生活・入浴は構いません。
- ◎ 接種後30分以内に**息苦しさや全身のかゆみ**などが現れたときは、大至急診察を受けてください。
- ◎ 5～14日の後に、**だるさ・不機嫌・発熱・発疹等**があらわれることがあります。これらの症状は、通常1～2日で消失します。**熱が続くようだったり、高熱やけいれん・出血症状**などがあつたりするときは**医師の診察**を受けてください。
- ◎ 妊娠の可能性のある女性は接種できません。また接種後2ヶ月は妊娠しないでください。

**今回は 1回目・2回目 の接種  
次は 水ぼうそう・おたふくかぜ  
(いずれも有料)・肺炎球菌  
がおすすめです。**

- ※ このワクチンは、製造工程でニフトリやウサギ由来などの成分を使用しています。(鶏卵そのものは使用していません)
- ※ 一回でも99%以上(武田薬品の製品)の人が免疫を得ることができですが、その後低下することもありますので、**小学校入学の前年度に2回目の接種**をおこないます。平成20年から5年間だけ、**中学1年生と高校3年生に2回目の接種**をおこないます。(4～6月に受けましょう)
- ※ 麻疹は人から人へしか伝染しない病気ですので、理論的にはワクチン接種により全世界から麻疹をなくすことが可能です。
- ※ 4週間たてば他の予防注射を受けることができます。医師の判断により、他の予防接種との同時接種も可能です。