



## 小児用 肺炎球菌ワクチン (プレベナー®) を受けた方へ

今回は 1回目・2回目・3回目・最終 の接種。  
次の肺炎球菌ワクチンは  
4～8週後・60日後以降・1歳～1歳3ヶ月

- ☺ 今日は接種部位を清潔に保ち、疲れすぎることや激しい運動は避けましょう。いつも通りの生活・入浴は構いません。
- ☺ 接種後30分以内に息苦しさや全身のかゆみなどが現れたときは、大至急診察を受けてください。
- ☺ 接種後に、高熱やけいれんなどの異常が出現した場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。接種後1週間は体調に注意し、接種後、腫れが目立つときや機嫌が悪くなったときなどは医師にご相談下さい。
- ☺ 次회가「1歳～1歳3ヶ月」の人は、「MR・水痘・おたふく・肺炎球菌・ヒブ・B型肝炎」の接種です。同時接種も可能です。

※ 1週間後には他の予防注射を受けることができます。

※ 本製品は7種類の肺炎球菌に対するワクチンです。2013年11月1日に13種類の肺炎球菌に対するワクチン“プレベナー13”に変わります。2012年8月生まれ以降の児の4回目は、11月になってから1才3ヶ月までの接種をおすすめします。

※ 本ワクチンの接種により健康被害が発生した場合には、「医薬品副作用被害救済制度」により治療費等が受けられる場合があります。詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ<http://www.pmda.go.jp>をご覧くださいか、フリーダイヤル：0120-149-931 へお問い合わせください。