




ロタリックス®  
**ロタワクチン**を受けた方へ  
(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン)

- ◎ 接種後しばらくは、嘔吐しないように気をつけてください。10分間嘔吐がなく、全身状態に変化がなければお帰りにいただいてかまいません。本剤の接種前後において、母乳を含めた食物や飲料の摂取に制限はありません。
- ◎ 帰宅途中・帰宅後には、健康状態によく気をつけて、体調の変化や、高熱、けいれんなどの異常な症状があらわれたら速やかに医師の診察を受けてください。
- ◎ **接種後2週間**の間は、おもつ交換などの後には**いつもより丁寧に手を洗って下さい**。  
 ワクチン由来ウイルスの糞便中への排泄が、接種後約7日をピークに平均で10日間認められています。ただし、このウイルスが他の人に伝播しても胃腸炎などの発症がないことが確認されています。
- ◎ 主な副反応は、易刺激性・下痢などです。
- ◎ **腸重積\***と思われる症状**(お腹の痛みのため激しく泣く・機嫌が悪いなどが周期的にみられる、さらにお腹がはる、ぐったりする、顔色が悪い、血便がみられる、嘔吐(おうと)をくりかえすなど)**があらわれた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。特に初回接種から7日間以内は注意してください。

\* 腸重積とは、腸管に腸管が入り込み、腸が閉塞状態になることをいいます。



※ ロタウイルス胃腸炎は、冬期に流行する嘔吐下痢症のひとつであり、もっとも重症になります。このワクチンは、ロタウイルスによる胃腸炎の重症化を防ぎます。

※ **接種してはならない人は?** 未治療の**先天性消化管障害**(メックェル憩室等)のある人・**過去に腸重積があった人**(腸重積症の発症リスクを増加させる可能性があります)、**重症複合型免疫不全(SCID)のある人**(ロタウイルス胃腸炎の発症の可能性がありますが)には使用することはできません。

※ 1.5mLの粘調な液体を飲んでいただきます。接種直後(例えば、5~10分以内)に嘔吐した場合は再度接種します(再接種の薬剤費用は製薬会社が負担してくれます)

☆今日が1回目の方は 4週間以降に(遅くとも生後24週0日まで)2回目を。

今日が2回目の方は ロタワクチンは今日で終了です。

☆他のワクチンが接種できるのは4週間後です。

<本剤の成分>

本剤には、有効成分及び添加物として次の成分が含まれています。

有効成分 弱毒生ヒトロタウイルス (RIX4414 株)

添加物 精製白糖 (安定剤)、アジピン酸 (緩衝剤)、  
 水酸化ナトリウム (緩衝剤)、ダルバッコ変法イーグル培地 (希釈剤)

※ 日本では、初回接種は生後20週0日まで接種して良いとコメントされていますが、当院では米国の規則にのっとり初回接種は生後15週以降の児にはおすすめておりません。