



水痘（みずぼうそう） ワクチンを受けた方へ

- ☺ 接種当日は接種部位を清潔に保ち、**疲れすぎることや激しい運動は避けましょう。**
いつもの生活・入浴は構いません。
- ☺ 接種後は健康状態に気をつけて下さい。
接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの以上を感じた場合は、
すぐに医師の診察を受けて下さい。
- ☺ 接種後30分以内に息苦しさや全身のかゆみなどが現れたときは、大至急診察を受けてください。
- ☺ 妊娠可能な人は、あらかじめ約1カ月間避妊した後に接種しましょう。また接種後2ヶ月間は避妊して下さい。

竹田こどもクリニック 文責：竹田 弘

今回は 1回目・2回目 の接種

1回目から3ヶ月以上の間隔をおいて2回目
(標準として6ヶ月後から12ヶ月後の間)

- ※ 2回接種をすると、水痘に罹る確率は、
1回接種の場合よりかなり少なくなりま
すが、まったく罹らなくなるわけではあ
りません。
- ※ 外国、とくに水痘の流行がなくなった
国では、2回目の接種は麻しん風しん(M
R) ワクチンの2回目と同時に接種して
います。日本でも、いつかは(10年以上
はかかるでしょうが)そのような接種方
法になると、院長は考えます。
- ※ 外国では麻しん・風しん・おたふく・
水痘が1本になったワクチンも使われて
いますが、日本には導入されていません。
- ※ 4週間たてば他の予防注射を受けるこ
とができます。他の予防接種との同時接
種も可能です。

(2014. 10. 01)改定第1版