

■竹田こどもクリニック院長おすすめの接種方法■

■3本・4本同時に接種する方法■

●経口生ポリオをご利用になる場合 来院回数: 5回

	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合	①	②	③	
ヒブ	①	②	③	
肺炎球菌	①	②	③	
B型肝炎	①	②		③ ※2
BCG		○ = = =		

*1

●不活化ポリオをご希望になる場合 来院回数: 7回

	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合	①	②	③	
ヒブ	①	②	③	
肺炎球菌	①	②	③	
B型肝炎	①	②		③ ※2
不活化ポリオ	①	②		③
BCG		○ = = =		

④
※3

●不活化ポリオをご希望になる場合 来院回数: 6回

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合		①	②	③	
ヒブ	①	②	③		
肺炎球菌	①	②		③	
B型肝炎	①	②			③ ※2
不活化ポリオ			①	②	③
BCG			○ = = =		

④
※3

■同時接種をしない場合■経口生ポリオをご利用になる場合

●生後3ヶ月から接種する場合 来院回数: 13回

	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合	①	②	③	
ヒブ	①	②	③	
肺炎球菌	①		②	③
B型肝炎			①	②
BCG		○ = = =		

③ ※2

●生後2ヶ月から接種する場合 来院回数: 13回

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合		①	②	③	
ヒブ	①	②	③	④	
肺炎球菌	①	②		③	
B型肝炎	①	②			③ ※2
BCG			○ = = =		

■3本や4本は嫌だが2本の同時接種なら良いとする人の場合■ 経口生ポリオをご利用になる場合

●生後3ヶ月から接種する場合 来院回数: 8回

	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合	①	②	③	
ヒブ	①	②	③	
肺炎球菌	①	②	③	
B型肝炎	①	②		③ ※2
BCG		○ = = =		

●生後2ヶ月から接種する場合 来院回数: 8回

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合		①	②	③	
ヒブ	①	②	③		
肺炎球菌	①	②	③		
B型肝炎	①	②			③ ※2
BCG			○ = = =		

■3本や4本は嫌だが2本の同時接種なら良いとする人の場合■ 不活化ポリオをご利用になる場合

●生後3ヶ月から接種する場合 来院回数: 9回

	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合	①	②	③	
ヒブ	①	②	③	
肺炎球菌	①	②	③	
B型肝炎	①	②		③ ※2
不活化ポリオ			①	②
BCG		○ = = =		

④
※3

●生後2ヶ月から接種する場合 来院回数: 9回

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合		①	②	③	
ヒブ	①	②	③		
肺炎球菌	①	②	③		
B型肝炎	①	②			③ ※2
不活化ポリオ		①	②		③
BCG			○ = = =		

④
※3

■はじめは1本だけ、だんだん同時接種にする場合■ 不活化ポリオをご利用になる場合

●生後3ヶ月から接種する場合 来院回数: 9回

	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合	①	②	③	
ヒブ	①	②	③	
肺炎球菌	①	②	③	
B型肝炎	①	②		③ ※2
不活化ポリオ	①	②		③
BCG		○ = = =		

④
※3

●生後2ヶ月から接種する場合 来院回数: 8回

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	
3種混合		①	②	③	
ヒブ	①	②	③		
肺炎球菌	①	②		③	
B型肝炎	①	②			③ ※2
不活化ポリオ		①	②		③
BCG			○ = = =		

④
※3

※1 BCG接種後に他のワクチンを接種できるのは4週間後です。

※2 B型肝炎の3回目は、2回目の20~24週間後です。

※3 不活化ポリオの4回目は、WHOおすすめの接種方法は4~6歳です。

4~6歳に、「三種混合+不活化ポリオ」を接種する選択もあります。

(他の国では、「三種混合」を5~6回接種しています。)