

竹田こどもクリニック院長おすすめ接種方法
B型肝炎・ロタ・不活化ポリオは有料です

2011.11.28改訂版

3・4種類 同時に接種する方法

経口生ポリオをご利用になる場合

1歳前までの来院回数: 8回 (6回 + インフルエンザ)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

2

不活化ポリオをご希望になる場合

1歳前までの来院回数: 8回 (6回 + インフルエンザ)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

2

同時接種をしない方法

ちょっと体調を崩したり、祝日があるだけで接種が終了しなくなるため
ロタワクチンをご希望の方にはおすすめできません。

予防接種は、近くの医療機関で接種しましょう。

から の方法とも、B型肝炎ワクチンを生後6ヶ月以降の10月11月にインフルエンザワクチンと同時に2回、その半年後に1回接種する方法でも良いでしょう。これ以外にもいろいろ方法が考えられます。
B型肝炎*とロタワクチン*・不活化ポリオは有料です。
不活化ポリオは、日本では未認可ワクチンのため補償がありません。

- 1 B C Gとロタワクチンは、接種後に他のワクチンを接種できるのは4週間後です。
- 2 B型肝炎の3回目は、2回目の20～24週間後です
- 3 不活化ポリオの4回目は、日本では1年後、米国の接種方法は4～6歳です。

生後1ヶ月をすぎたら、当院へお電話ください。予約をおとりします。
生後2ヶ月になってまず1回目の予防接種は、「ヒブ」or「ヒブ+ロタ」or「ヒブ+ロタ+肺炎球菌」or「ヒブ+ロタ+肺炎球菌+B型肝炎」or「ヒブ+不活化ポリオ」のどれかです。

ロタワクチン1回目は生後20週0日(4ヶ月17～20日)までに接種
当院では生後14週6日(3ヶ月12～15日)までに接種
ロタワクチン2回目は生後24週0日(5ヶ月15～18日)までに接種

はじめは少しだけ、だんだん同時を増やす方法

経口生ポリオをご利用になる場合

1歳前までの来院回数: 8回 (5回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

経口生ポリオをご利用になる場合

1歳前までの来院回数: 9回 (6回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

不活化ポリオをご希望になる場合

1歳前までの来院回数: 9回 (6回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

不活化ポリオをご希望になる場合

1歳前までの来院回数: 10回 (7回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

3本や4本は嫌だが2本の同時接種なら良いとする人におすすめの方法

経口生ポリオをご利用になる場合

1歳前までの来院回数: 9回 (6回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

経口生ポリオをご利用になる場合

1歳前までの来院回数: 10回 (7回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月
3種混合				
ヒブ				
肺炎球菌				
B型肝炎*				
ロタ ワクチン*	=	=	=	=
不活化ポリオ*				
B C G			*1	=

不活化ポリオをご希望になる場合

1歳前までの来院回数: 11回 (8回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	生後6ヶ月
3種混合					
ヒブ					
肺炎球菌					
B型肝炎*					
ロタ ワクチン*	=	=	=	=	=
不活化ポリオ*					
B C G			*1	=	=

不活化ポリオをご希望になる場合

1歳前までの来院回数: 10回 (7回 + インフルエンザ + B型肝炎)

	生後2ヶ月	生後3ヶ月	生後4ヶ月	生後5ヶ月	生後6ヶ月
3種混合					
ヒブ					
肺炎球菌					
B型肝炎*					
ロタ ワクチン*	=	=	=	=	=
不活化ポリオ*					
B C G			*1	=	=